

同時服用鴉片類藥物和苯二氮平類藥物的風險



同時服用這兩種藥物與單獨服用其中一種藥物相比，危險更大！

Federal Drug Agency (FDA) 已經發出警告，同時服用苯二氮平類藥物 (苯並類藥物) 與鴉片類藥物是非常危險的。這兩種藥物都會使呼吸減慢，而可能導致昏迷或死亡。



安全服藥非常重要。就您的藥物諮詢您的醫生，可有助於您學習安全服藥。即使您從別處獲得藥物或只是偶爾服用，告訴您的醫生也有助於保證您的安全。

同時服用鴉片類藥物和苯並類藥物，人們死於藥物過量的風險達到 10 倍。

鴉片類藥物

- 可待因/乙醯胺苯酚 (含# 3 或 # 4 可待因的 Tylenol®)
- 二氫可待因酮/乙醯胺苯酚 (Norco, Vicodin®)
- 二氫嗎啡酮 (Dilaudid®)
- 氧可酮/乙醯胺苯酚 (Percocet®)
- 硫磺嗎啡 ER (MS Contin®)
- 美沙酮 (Methadose®)
- 氧可酮 ER (OxyContin®)
- 酚太尼貼 (Duragesic®)



「街頭」鴉片類藥物

醫生不使用這些藥物治療疼痛，但它們與醫生開的鴉片類藥物同樣可導致呼吸減慢。

- 海洛因 (黑焦油，白色)
- 芬太尼



苯二氮平類藥物 (苯並類藥物)

- 勞拉西泮 (Ativan®)
- 氯硝西泮 (Klonopin®)
- 地西泮 (Valium®)
- 阿普唑侖 (Xanax®)
- 氯氮卓
- 二鉀氯氮
- 奧沙西泮
- 氧異安定 (Onfi®)
- 替馬西泮 (Restoril®)
- 三唑侖



還有一些藥物和物質，在與鴉片類藥物或苯二氮平類藥物服用時也會增加藥物過量的風險：

- 酒精**
- 葡萄酒、啤酒
 - 烈酒

- 抗精神病藥**
- 喹噻平 (Seroquel®)
 - 利培酮 (Risperdal®)

- 加巴噴丁類似藥物**
- 加巴噴丁
 - 普瑞巴林 (Lyrica®)

- 肌肉鬆弛藥**
- 環苯扎林 (Flexeril®)
 - 巴氯芬

如果您使用其中的任何產品，即使偶爾使用，也應告訴您的醫生。

有疑問？請致電客戶服務部，電話：1(415) 547-7800
週一至週五 8:30am 至 5:30pm