

# 同時服用鴉片類藥物和苯二氮平類藥物的風險

同時服用這兩種藥物與單獨服用其中一種藥物相比，危險更大！

Federal Drug Agency (FDA) 已經發出警告，同時服用苯二氮平類藥物（苯並類藥物）與鴉片類藥物是非常危險的。這兩種藥物都會使呼吸減慢，而可能導致昏迷或死亡。



安全服藥非常重要。就您的藥物諮詢您的醫生，可有助於您學習安全服藥。即使您從別處獲得藥物或只是偶爾服用，告訴您的醫生也有助於保證您的安全。

同時服用鴉片類藥物與苯二氮平類藥物，會增加藥物過量致死的風險。

## 鴉片類藥物

- 可待因/乙醯胺苯酚（含# 3 或 # 4 可待因的 Tylenol®）
- 二氫可待因酮/乙醯胺苯酚 (Norco, Vicodin®)
- 二氫嗎啡酮 (Dilaudid®)
- 氧可酮/乙醯胺苯酚 (Percocet®)
- 硫磺嗎啡 ER (MS Contin®)
- 美沙酮 (Methadose®)
- 氧可酮 ER (OxyContin®)
- 酚太尼貼 (Duragesic®)



## 苯二氮平類藥物 (苯並類藥物)

- 勞拉西洋 (Ativan®)
- 氯硝西洋 (Klonopin®)
- 地西洋 (Valium®)
- 阿普唑侖 (Xanax®)
- 氯氮卓
- 二鉀氯氮
- 奧沙西洋
- 氧異安定 (Onfi®)
- 替馬西洋 (Restoril®)
- 三唑侖



## 「街頭」鴉片類藥物

醫生不使用這些藥物治療疼痛，但它們與醫生開的鴉片類藥物同樣可導致呼吸減慢。

- 海洛因（黑焦油，白色）
- 芬太尼



還有一些藥物和物質，在與鴉片類藥物或苯二氮平類藥物服用時也會增加藥物過量的風險：

### 酒精

- 葡萄酒、啤酒
- 烈酒

### 抗精神病藥

- 喹噻平 (Seroquel®)
- 利培酮 (Risperdal®)



### 加巴噴丁類似藥物

- 加巴噴丁
- 普瑞巴林 (Lyrica®)

### 肌肉鬆弛藥

- 環苯扎林 (Flexeril®)
- 巴氯芬

如果您使用其中的任何產品，即使偶爾使用，也應告訴您的醫生。

有疑問？請致電客戶服務部，電話：1(415) 547-7800

週一至週五 8:30am 至 5:30pm