

# Риски одновременного приема опиоидных препаратов и бензодиазепинов

## Одновременный прием бензодиазепинов и опиоидов более опасен, чем прием каждого из них по отдельности!

Федеральное агентство по борьбе с наркотиками (FDA) выдало предупреждение о том, что прием одновременно бензодиазепинов (также могут именоваться как «бензы») и опиоидов крайне опасен. Обе группы препаратов угнетают дыхание, что может привести к коме или смерти.



Очень важно правильно принимать препараты. Проконсультируйтесь со своим врачом о принимаемых препаратах, чтобы узнать, как их правильно принимать. Даже если вы получили препарат от кого-то другого или принимаете его лишь изредка, вы сохраните себе жизнь, рассказав о нем своему врачу.

**Одновременный прием опиоидов и бензодиазепинов повышает риск смерти от передозировки.**

### Опиоидные препараты

- Кодеин / ацетоминофен (Tylenol<sup>®</sup> с Кодеином N°3 или N°4)
- Гидрокодон / ацетоминофен (Norco, Vicodin<sup>®</sup>)
- Гидроморфон (Dilaudid<sup>®</sup>)
- Оксикодон / ацетоминофен (Percocet<sup>®</sup>)
- Морфина сульфат ER (MS Contin<sup>®</sup>)
- Метадон (Methadose<sup>®</sup>)
- Оксикодон ER (OxyContin<sup>®</sup>)
- Фентаниловый пластырь (Duragesic<sup>®</sup>)



### Бензодиазепины (бензы)

- Лоразепам (Ativan<sup>®</sup>)
- Клоназепам (Klonopin<sup>®</sup>)
- Диазепам (Valium<sup>®</sup>)
- Алпразолам (Xanax<sup>®</sup>)
- Хлордиазепоксид
- Клодразепат
- Оксазепам
- Клобазам (Onfi<sup>®</sup>)
- Тетазепам (Restoril<sup>®</sup>)
- Триазолам



### Нелегальные наркотические средства

Не используются врачами для лечения болевого синдрома, но вызывают такое же угнетение дыхания, как и прописываемые врачами препараты.

- Героин (герыч, гера)
- Фентанил



## Некоторые другие препараты и вещества, которые повышают риск передозировки при одновременном приеме с опиоидами и бензодиазепинами:

### Спирт

- Вино, пиво
- Крепкий алкоголь

### Нейролептики

- Кветиапин (Seroquel<sup>®</sup>)
- Рисперидон (Risperdal<sup>®</sup>)



### Габапентиноиды

- Габапентин
- Прегабалин (Lyrica<sup>®</sup>)



### Миорелаксанты

- Циклобензаприн (Flexeril<sup>®</sup>)
- Баклофен

Если вы принимаете какие-либо из указанных препаратов, даже если это происходит редко, сообщите об этом своему врачу.

**Есть вопросы? Позвоните в Отдел обслуживания участников программы по телефону 1(415) 547-7800.**

С понедельника по пятницу, с 8:30am до 5:30pm