

Список профилактических лекарственных средств АСА с доплатой 0 долл. США

Профилактические лекарственные препараты — это отдельные лекарственные препараты, которые покрываются без дополнительной оплаты в соответствии с требованиями к покрытию профилактических услуг, предусмотренными Законом о защите пациентов и доступном медицинском обслуживании (Patient Protection and Affordable Care Act, ACA) и Законом о плане медицинского обслуживания Нокса — Кина (Knox-Keene Health Care Service Plan Act, Knox-Keene Act).

Ниже приведен перечень профилактических лекарственных препаратов с показаниями к применению, которые покрываются аптечными льготами на амбулаторное лечение в рамках программы Healthy Workers НМО плана San Francisco Health Plan (SFHP), с доплатой в размере 0 долл. США согласно АСА. Этот перечень был обновлен 06/30/2025 и может быть изменен. С перечнем вакцин, покрываемых Healthy Workers НМО, которые являются обязательными в соответствии с Законом о доступном здравоохранении (ACA) и Законом Нокс-Кина (Knox-Keene Act), можно ознакомиться на сайте sfhp.org/programs/healthy-workers/benefits/pharmacy-services.

Профилактические препараты	Наименование препарата (дозировка)	Показания к применению
Антиретровирусная терапия	<ul style="list-style-type: none"> эмтрицитабин 200 мг / тенофовир 300 мг (непатентованный препарат Truvada) Descovy 200 мг / 25 мг Apretude 	<p>Профилактика ВИЧ с помощью препаратов PrEP или PEP. Для лиц, подверженных высокому риску заражения ВИЧ.</p> <p>*В случае лечения ВИЧ применяется обычная доплата, если это применимо.</p>
Аспирин	<ul style="list-style-type: none"> аспирин 81 мг 	Рекомендуется после 12 недель беременности лицам с высоким риском развития преэклампсии.
Препараты для подготовки кишечника	<ul style="list-style-type: none"> Gavilyte -C Gavilyte-G Раствор PEG-3350 сульфат натрия-сульфат калия-сульфат магния (непатентованное наименование Suprep) 	В рамках профилактической колоноскопии для взрослых в возрасте от 45 до 75 лет.

Профилактические препараты	Наименование препарата (дозировка)	Показания к применению
Препараты для профилактики рака молочной железы	<ul style="list-style-type: none"> • анастрозол • ралоксифен • тамоксифен • летрозол 	В качестве первичной профилактики рака молочной железы у женщин с повышенным риском развития заболевания.
Фолиевая кислота	<ul style="list-style-type: none"> • фолиевая кислота 0,4 мг, 0,8 мг 	Для всех женщин, планирующих или способных забеременеть, с целью снижения риска врожденных аномалий развития.
Статины	<ul style="list-style-type: none"> • аторвастатин • ловастатин • правастатин • розувастатин • симвастатин 	Для взрослых с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний (CVD) (таких как инфаркт или инсульт).
Препараты для отказа от курения и употребления табачных изделий	<ul style="list-style-type: none"> • бупропион гидрохлорид SR • никотиновая жевательная резинка • никотиновые леденцы • никотиновый пластырь • никотиновый ингалятор 	Для тех, кто употребляет табачные изделия и желает отказаться от вредной привычки.

Для получения более подробной информации звоните в Отдел обслуживания Участников плана по телефону **1(800) 288-5555** или **1(415) 547-7800**. Лицам с нарушениями слуха следует звонить на линию TDD/TYY через службу California Relay Service по номеру **711**. Вы можете запросить этот документ в альтернативном формате, например, набранный шрифтом Брайля, крупным шрифтом и в форме аудиозаписи. Чтобы запросить информацию в другом формате или попросить о помощи в чтении этого



документа и прочих материалов SFHP, следует обращаться в Отдел обслуживания участников плана по телефону **1(415) 547-7800** или на бесплатную линию по номеру **1(800) 288-5555**.